

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO IGC

Índice do Grau de Complexidade

1 - Sobressaliência

Distância entre o bordo incisal do incisivo central superior mais protraído e o incisivo mandibular mais protraído.

Para sobressaliência:

de **0** mm (topo a topo) 1 ponto é computado;

de 0 até 3 mm, **nenhum** ponto é computado;

de 3.1 até 5 mm, **2** pontos;

de 5.1 até 7 mm, **3** pontos;

de 7.1 até 9 mm, **4** pontos, e para os casos acima

de 9.1 mm, **5** pontos são computados.

Em caso de sobressaliência negativa (mordida cruzada anterior) é computado **1** ponto por **mm**.

2 - Sobremordida

Para sobremordida de até 3 mm, **nenhum** ponto é computado;

de 3.1 até 5 mm, **2** pontos;

de 5.1 até 7 mm, **3** pontos;

e quando existir contato do incisivo inferior com o palato, **5** pontos são computados.

3 - Mordida Aberta Anterior

Quando incisivos superiores e inferiores se encontram em posição de topo a topo (overbite = 0) **1** ponto é computado. Para cada **mm** de M.A., **2** pontos são computados para cada dente de canino a canino. Caninos superiores com bloqueio vestibular por falta de espaço não são julgados.

4 - Mordida Aberta lateral

Para cada elemento dentário superior (do 1º pré-molar ao 3º molar), em situação de mordida aberta com o arco inferior, são computados **2** pontos por **mm**, por **elemento** dentário.

5 – Apinhamento

O arco mais apinhado (superior ou inferior) é escolhido e avaliado. De **1** até **3** mm, **1** ponto é computado; de 3.1 até 5 mm, **2** pontos são computados; de 5.1 até 7mm, **4** pontos são computados. Se o apinhamento for maior que 7.1 mm, **7** pontos são computados.

6 - Oclusão

Para avaliação de oclusão é utilizada a Classificação de Angle. Para uma posição da cúspide méso-vestibular do primeiro molar superior ocluindo com o sulco méso-vestibular do primeiro molar inferior, ou até a cúspide méso-vestibular (relação topo a topo), nenhum ponto é computado. Para uma posição topo a topo Classe II ou III, **2** pontos são computados por lado, e quando a relação é de Classe II ou III completa, **4** pontos são computados por lado. Quando a relação oclusal estiver além de Classe II ou III, **1** ponto por mm é computado para cada lado.

7 - Mordida Cruzada Posterior - Lingual

Para cada dente superior em região posterior (de 1º pré-molar a 3º molar) um **(1)** ponto é computado.

8 - Mordida Cruzada Posterior – Vestibular

Para cada dente superior posterior (de 1º pré-molar a 3º molar) em mordida cruzada vestibular total, **2** pontos são computados.

9 - Cefalometria

- **ANB**

- Quando o ângulo **ANB** for maior que **5.5** graus, ou **menor** que **-1.5** graus, **4** pontos são computados.
- Para cada grau adicional **acima** ou **abaixo** destes valores, **1** ponto adicional é computado.

- **SN-Go-Gn**

- De 27° até 37°, **nenhum** ponto é computado.
- **Maior** que 37°, **2** pontos são computados para cada grau **acima** de 37°.
- **Menor** que 27°, **1** ponto é computado para cada grau **abaixo** de 27°.

- **IMPA**

- **Maior** que 98°, **1** ponto é computado para cada grau **acima** de 98°.

10 - Outros:

Um adicional de **2** pontos pode ser computado para cada **uma** das situações a seguir (ou outras além destas):

- Ausência congênita de dentes (com exceção dos terceiros molares)
- Dentes supra-numerários
- Impacções (com exceção dos terceiros molares)
- Irrupções ectópicas
- Anomalias de forma ou tamanho de dente
- Discrepância de linhas mediana maiores que 3 mm
- Assimetrias esqueléticas (envolvendo compensações dentárias para complementação de casos)